



BEST

Προϊόν: Σύμμεικτο υδατοδιαλυτό λιπάσμα NPK

Τύπος: 15-5-30+3MgO+IXN+3% Ο.Π.

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Β/Β

ΑΖΩΤΟ (N) ΟΛΙΚΟ	14,92%
Νιτρικό (NO ₃)	7,42%
Αμμωνιακό (NH ₄)	0,64%
Ουρικό (NH ₂)	6,86%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	5%
100% διαλυτός στο νερό	
ΚΑΛΙΟ (K ₂ O)	30%
100% διαλυτό στο νερό	
ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO)	3%
100% διαλυτό στο νερό	
Βόριο (B)	0,01%
Χαλκός (Cu*)	0,01%
Σίδηρος (Fe*)	0,03%
Σίδηρος (Fe**)	0,06%
Μαγγάνιο (Mn*)	0,026%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,001%
Ψευδάργυρος (Zn*)	0,03%

* Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

** Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDDHMA

Οργανικοί παράγοντες 3%
(Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα BEST χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, χαμηλό pH, παρουσία οργανικών παραγόντων (Βιοδιεγερτών) & Σιδήρου σε μορφή EDDHMA. Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα BEST εφαρμόζονται είτε μέσω των συστημάτων άρδευσης, στο έδαφος ή διαφυλλικά με ψεκασμό. Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα BEST είναι κατάλληλα για χρήση σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών με έμφαση στις καλλιεργείες κηπευτικών (θερμοκηπιακές ή υπαίθριες), στα οπωροφόρα δένδρα, στην αμπελοκαλλιέργεια (επιτραπέζια & σταφύλια οиноποιίας), σε καλλιεργείες βιομηχανικών φυτών, καθώς επίσης και σε όλο το εύρος των φυτών μεγάλης καλλιεργείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Οι δόσεις εφαρμογής διαφέρουν ανά καλλιέργεια & στάδιο εφαρμογής.

Για κηπευτικές καλλιεργείες εφαρμόζονται σε διάλυση 0,5-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.

Σε αμπέλια εφαρμόζονται 50-70g ανά πρέμνο για εφαρμογές στο έδαφος και 300-400g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 4 ετών).

Σε καλλιέργεια ελιάς & οπωροφόρα δένδρα εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος & για διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500g/100L νερό. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 6 ετών).

Σε φυλλώδη λαχανικά εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.

Σε εκτατικές καλλιεργείες διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500 gr/100L νερό.