

## AMICA

Συμπυκνωμένο υγρό σκεύασμα συμπλόκου Ασβεστίου με Αμινοξέα.



### ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αζωτο Ουρικό (N)	10% (w/v)
Ασβέστιο (CaO)	12,5% (w/v)
Οργανική ουσία	12,5% (w/v)
pH	8,8
Ειδικό βάρος	1,25 Kg/L
Χρώμα	Σκούρο καφέ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το AmiCa είναι ένα εξειδικευμένο διαφυλλικό λίπασμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε Ασβέστιο. Εμπλουτισμένο επιπλέον και με ελευθέρα αμινοξέα, αποτελεί ένα ισορροπημένο διαφυλλικό λίπασμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τροφοπενιών Ασβεστίου. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την πρόληψη της ξήρανσης ράχης του αμπελιού, της πικρής κηλίδωσης και της φυλλόπτωσης των Μήλων Golden Delicious. Έχει άμεση επίδραση στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων φυτικών προϊόντων.

Το AmiCa περιέχει ένα φυσικό πολυπεπτιδικό πρόσθετο το οποίο προσαρμόζεται σε μέσο μοριακό βάρος, οδηγεί σε εμφανή μείωση της επιφανειακής τάσης και προάγει τη συγκολλητικότητα. Τα πεπτίδια με μεσαία αλυσίδα, απορροφώνται αργά από τα φύλλα και τα φρούτα, προωθώντας ταυτόχρονα τον μεταβολισμό του φυτού.

Το AmiCa έχει τα εξής οφέλη:

- Προϊόν υψηλής περιεκτικότητας σε Ασβέστιο και Αμινοξέα.
- Απόλυτα ασφαλές σε συνιστώμενες δόσεις.
- Βέλτιστη πρόσληψη Ασβεστίου.
- Εύκολο στη χρήση.
- Συμβατό με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα.
- Βελτιώνει τον χρωματισμό των φρούτων.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το AmiCa εφαρμόζεται μέσω διαφυλλικής εφαρμογής.

#### Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Αμπέλι: 250 - 300 cc / 100L. Για την αντιμετώπιση της ξήρανσης ράχης του αμπελιού. Έναρξη ψεκασμών αμέσως μετά την καρπόδεση. Επαναλήψεις εφαρμογών (4 - 5), σε διάστημα μεταξύ τους 10 - 15 ημέρες.
- Μηλοειδή: 250 - 300 cc / 100 L. Συνιστάται για την αντιμετώπιση της φυλλόπτωσης των Golden delicious και της πικρής κηλίδωσης. Έναρξη ψεκασμών ένα μήνα μετά την πτώση των πετάλων έως και 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή, σε διάστημα εφαρμογών 15-20 ημερών.
- Πυρηνόκαρπα: 200 - 300 cc / 100 L. Για την πρόληψη της τροφοπενίας Ασβεστίου. 4 - 5 διαφυλλικές εφαρμογές, ανά 10 - 15 ημέρες.
- Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα: 300 cc / 100 L. Για την αντιμετώπιση της κηλίδωσης της τομάτας. Έναρξη ψεκασμών όταν οι τομάτες του πρώτου σταυρού αρχίζουν να ωριμάζουν. 3-5 ψεκασμοί, κρίνονται απαραίτητοι, σε διάστημα μεταξύ τους περίπου 15 ημερών.
- Μαρούλι: 250 cc / 100 L. 2 - 3 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση, επανάληψη εφαρμογής 7 - 10 ημέρες αργότερα.



- Αγγούρι - Κολοκύθι: 250 cc / 100 L, 2 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση, επανάληψη εφαρμογής 7-10 ημέρες μετά.
- Σταυρανθή: 250 cc / 100 L. 1η εφαρμογή πριν το σχηματισμό της κεφαλής, επανάληψη εφαρμογής 7 - 10 ημέρες μετά.
- Ακτινίδιο: 300 cc / 100 L. 3 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών από την καρπόδεση, επαναλήψεις κάθε 10-15 ημέρες.
- Φράουλα: 300 cc / 100 L. 3 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών από την καρπόδεση, επαναλήψεις κάθε 10-15 ημέρες.

### **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το AmiCa συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας. Συνιστάται να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας. Να αναμιγνύεται καλά κατά την προσθήκη του στο ψεκαστικό διάλυμα.

### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

1L