

FOLICAL

Εξειδικευμένο παρασκεύασμα συμπλόκου Ασβεστίου με Φουλβικά οξέα.



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οξείδιο του Ασβεστίου 26% (w/v)
Μορφή συμπλόκου με Φουλβικό οξύ

pH 2,5
Ειδικό βάρος 1,35 Kg/L
Χρώμα Ανοιχτό κίτρινο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το FOLICAL 26, βασίζεται σε Ασβέστιο υψηλής συγκέντρωσης, μορφής συμπλόκου με Φουλβικό οξύ, γεγονός το οποίο το καθιστά μία ταχέως διαθέσιμη πηγή Ασβεστίου για τα φυτά. Το Ασβέστιο είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για τη θρέψη των φυτών. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση κυτταρικών τοιχωμάτων και μεμβρανών, απαραίτητων για την εξασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη μετασυλλεκτική διάρκεια. Η διασφάλιση ότι τα διαχωριστικά κύτταρα λαμβάνουν όλη την απαραίτητη ποσότητα Ασβεστίου που χρειάζονται, είναι μια πραγματική πρόκληση. Το FOLICAL 26 περιέχει φουλβικό οξύ το οποίο είναι ένας φυσικός χηλικός παράγοντας υποβοήθησης πρόσληψης Ca από τα φυτά.

Η τακτική εφαρμογή του FOLICAL 26 στο φύλλωμα, καθιστά το Ασβέστιο πιο ευκίνητο εντός του φυτού.

Το FOLICAL 26, έχει τα εξής οφέλη:

- Προϊόν υψηλής περιεκτικότητας σε Ασβέστιο.
- Απόλυτα ασφαλές σε συνιστώμενες δόσεις.
- Υγρό παρασκεύασμα μίξης ακόμα και σε χαμηλές ποσότητες νερού.
- Βέλτιστη πρόσληψη Ασβεστίου.
- Εύκολο στη χρήση.
- Συμβατό με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα.
- Χαμηλό pH για βελτιωμένη πρόσληψη.
- Ιδανικό για εφαρμογές τόσο μέσω της υδρολίπανσης, όσο μέσω και των διαφυλλικών εφαρμογών.
- Μπορεί να αναμιχθεί και με σκευάσματα Φωσφόρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το FOLICAL 26, εφαρμόζεται μέσω διαφυλλικής εφαρμογής.

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Πυρηνόκαρπα: 250 - 500 cc / 100 L. 1η εφαρμογή στην πτώση των πετάλων, 2η όταν το μέγεθος φρούτων είναι στα 10 χιλιοστά και στη συνέχεια επανάληψη, σε διαστήματα 7 - 10 ημερών έως τη συγκομιδή.
- Φράουλες: 250 - 500 cc / 100 L, σε διαστήματα 10 - 14 ημερών κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και στον σχηματισμό των καρπών.
- Τομάτες: 250 - 500 cc / 100 L. Εφαρμογή μετά την ανθοφορία, στη συνέχεια επανάληψη σε διαστήματα 10 - 14 ημερών, όπως απαιτείται.
- Μαρούλι: 250 - 500 cc / 100 L στο μέσο της ανάπτυξης, επανάληψη σε διαστήματα 10 - 14 ημερών, όπως απαιτείται.
- Κρεμμύδια: 250 - 500 cc / 100 L, 1η εφαρμογή κατά τον σχηματισμό των βολβών και επαναλήψεις ανά διαστήματα 14 ημερών, έως τη συγκομιδή.
- Καρότα: 250 - 500 cc / 100 L. Εφαρμογή όταν το φυτικό ύψος της καλλιέργειας βρίσκεται στα 15 εκατοστά.
- Πατάτες: 250 - 500 cc / 100 L. Εφαρμογή κάθε 21 ημέρες μετά το σχηματισμό κονδύλων (3 - 4 εφαρμογές συνολικά).



- Εσπεριδοειδή: 500 - 700 cc / 100 L, 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες μεταξύ τους. 1η εφαρμογή όταν οι καρποί βρίσκονται στη διάμετρο των 3 - 4 εκατοστών.
- Μπανάνες: 250 - 500 cc / 100 L, εφαρμογή κάθε μήνα.
- Αμπέλι: 250 - 300 cc / 100 L. Για την αντιμετώπιση της ξήρανσης ράχης του αμπελιού. Έναρξη διαφυλλικών εφαρμογών αμέσως μετά την καρπόδεση. 4 - 5 ψεκασμοί κρίνονται απαραίτητοι, σε διάστημα μεταξύ τους 10 - 15 ημερών.
- Μήλο & Αχλάδι: 250 - 300 cc / 100 L. Για την αντιμετώπιση της φυλλόπτωσης των Golden Delicious και της πικρής κηλίδωσης, έναρξη ψεκασμών ένα μήνα μετά την πτώση των πετάλων έως και 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάστημα μεταξύ των ψεκασμών, 15 - 20 ημέρες.
- Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα: 300 cc / 100 L. Για την αντιμετώπιση της κηλίδωσης της τομάτας. Έναρξη ψεκασμών όταν οι τομάτες του πρώτου σταυρού αρχίζουν να ωριμάζουν. 3 - 5 ψεκασμοί κρίνονται απαραίτητοι, με διάστημα μεταξύ τους περίπου 15 ημερών.
- Αγγούρι - Κολοκύθι: 250 cc / 100 L. Εφαρμογή 2 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση, επανάληψη 7 - 10 ημέρες μετά.
- Σταυρανθή: 250 cc / 100 L. 1η εφαρμογή πριν το σχηματισμό της κεφαλής, επανάληψη 7 - 10 ημέρες μετά.
- Ακτινίδιο: 300 cc / 100 L. 3 εφαρμογές, αρχίζοντας από την καρπόδεση, με επαναλήψεις ανά 10 - 15 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το FOLICAL 26 συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1L, 3L