

PHYTOPLEX SP

Στερεό λιπάσμα Ιχνοστοιχείων, χηλικής μορφής EDTA και EDDHMA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφωπενιών.



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βόριο (B)	1,5%
Χαλκός (Cu) EDTA	1,0%
Σίδηρος (Fe) EDTA	3,0%
Σίδηρος (Fe) EDDHMA	1,0%
Μαγγάνιο (Mn) EDTA	2,0%
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA	3,0%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,05%

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το rhytorplex SP είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Ιχνοστοιχείων, ιδιαίτερα διαλυτό στο νερό. Τα Ιχνοστοιχεία Σιδήρου, Μαγγανίου, Ψευδαργύρου, Βορίου, Χαλκού και Μολυβδαίνιου, συνεισφέρουν ταυτόχρονα στη θρέψη των φυτών, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για την φυσιολογική ανάπτυξή τους και την αύξηση της παραγωγής τους.

Επιπλέον, τα θρεπτικά συστατικά Βορίου και Μολυβδαίνιου, που περιέχονται στο rhytorplex SP, βρίσκονται σε χηλική EDTA μορφή, με αποτέλεσμα η πρόσληψη και η μετακίνησή τους εντός των φυτών, να διευκολύνεται. Ο Σίδηρος χηλικής μορφής EDDHMA, βρίσκεται σε μία μορφή ιδιαίτερα σταθερή σε αλκαλικές συνθήκες (pH έως και 12), καθιστώντας έτσι το προϊόν διαθέσιμο και αποτελεσματικό για εφαρμογές εδάφους.

Η εφαρμογή του rhytorplex SP εξασφαλίζει:

- Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα αφομοίωσης και μετακίνησης των Ιχνοστοιχείων, ως αποτέλεσμα της παρουσίας EDTA και EDDHMA παράγοντα.
- Άριστη διαλυτότητα και ομοιογένεια στο διάλυμα, λόγω της microgranular μορφής του.
- Ασφαλές προϊόν στις συνιστώμενες δόσεις – μηδενικές περιπτώσεις φυτοτοξικότητας.
- Πλήρες βιοδιασπώμενο προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το rhytorplex SP εφαρμόζεται με διαφυλλικό τρόπο και μέσω της υδρολίπανσης.

Γενική δοσολογία:

- 100 - 150 g / 100 L (Διαφυλλική εφαρμογή).
- 0,5 - 1 kg / στρέμμα (Υδρολίπανση).

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Φυτά μεγάλης καλλιέργειας: Εφαρμογές στην εγκατάσταση της καλλιέργειας, επανάληψη εφαρμογής 10 - 15 ημέρες μετά, τελευταία εφαρμογή μετά από 10 - 15 ημέρες από την προηγούμενη.
- Βοσκότοποι, Μηδική και Κτηνοτροφικά φυτά: Εφαρμογή μετά από κάθε βόσκηση ή κοπή.
- Πατάτες και άλλες καλλιέργειες κονδύλων: 4 εφαρμογές από το στάδιο 10 εκατοστών, έως και μετά την άνθηση, σε διαστήματα 7-10 ημερών μεταξύ τους.
- Φυλλώδη λαχανικά: 3 εφαρμογές. Εφαρμογή στο στάδιο του επαρκούς φυλλώματος. Επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.
- Αμπέλια (Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια): 2 - 3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου, αρχίζοντας από το στάδιο βλάστησης 10 cm.
- Δενδρώδεις καλλιέργειες: 2 - 3 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου.
- Φράουλες: Εφαρμογή όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα.
- Καλλωπιστικά φυτά - Γκαζόν: Εφαρμογές αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων τροφωπενίας.



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το rhytorplex SP συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά, εκτός προϊόντων αλκαλικής αντίδρασης, Θείου, Λαδιού και Χαλκού. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1Kg, 5kg, 20kg