



POLY-ENERGOL

Προϊόν: Σύμμεικτο υδατοδιαλυτό λίπασμα NPK
Τύπος: 23-8-23+IXN

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Β/Β

AΖΩΤΟ (Ν) ΟΛΙΚΟ	23%
Νιτρικό (ΝΟ ₃)	5,8%
Αμμωνιακό (ΝΗ ₄)	2,5%
Ουρικό (ΝΗ ₂)	14,7%
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P ₂ O ₅)	8%
100% διαλυτό στο νερό	
ΚΑΛΙΟ (Κ ₂ O)	23%
100% διαλυτό στο νερό	
Βόριο (B)	0,04%
Χαλκός (Cu*)	0,02%
Σίδηρος (Fe*)	0,06%
Μαγγάνιο (Mn*)	0,04%
Ψευδάργυρος (Zn*)	0,04%

* Σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα POLY-ENERGOL χαρακτηρίζονται από υψηλή διαλυτότητα, αυξημένη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων & χαμηλό pH. Παρασκευάζονται με την χρήση της τεχνολογίας STIM Technology, ή οποία προσδίδει ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν στην καλύτερη αφομοιωσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και την δυνατότητα των φυτών να ανταπεξέρχονται δυσμενείς καταστάσεις αβιοτικού stress. Τα υδατοδιαλυτά λιπάσματα POLY-ENERGOL εφαρμόζονται είτε μέσω των συστημάτων άρδευσης, στο έδαφος ή διαφυλλικά με ψεκασμό. Είναι κατάλληλα για χρήση σε μεγάλο εύρος καλλιεργειών, όπως καλλιέργειες κηπευτικών (θερμοκηπιακές ή υπαίθριες), στα οπωροφόρα δένδρα, στην αμπελοκαλλιέργεια (επιτραπέζια & σταφύλια οινοποιίας), σε καλλιέργειες βιομηχανικών φυτών, καθώς επίσης και σε όλο το εύρος των φυτών μεγάλης καλλιέργειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Οι δόσεις εφαρμογής διαφέρουν ανά καλλιέργεια & στάδιο εφαρμογής.

Για κηπευτικές καλλιέργειες εφαρμόζονται σε διάλυση 0,5-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος (Γενική δόση: 1-5 kg/στρέμμα) και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.

Σε αμπέλια εφαρμόζονται 50-70g ανά πρέμνο για εφαρμογές στο έδαφος και 300-400g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 4 ετών).

Σε καλλιέργεια ελιάς & οπωροφόρα δένδρα εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος (Γενική δόση: 0,2-0,3 kg/δένδρο) & για διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500g/100L νερό. (Οι δόσεις για εφαρμογές στο έδαφος αφορούν σε καλλιέργεια σε πλήρη ανάπτυξη & άνω των 6 ετών).

Σε φυλλώδη λαχανικά εφαρμόζονται σε διάλυση 1,0-1,5g/L νερού για εφαρμογές στο έδαφος και 200-300g/100L για διαφυλλικές εφαρμογές.

Σε εκτατικές καλλιέργειες διαφυλλικές εφαρμογές με δόση 200-500g/100L νερό.