

VIOMIX B - Zn

Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου-Βορίου χηλικής μορφής.



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψευδάργυρος (Zn) EDTA	3,5% (w/v)
Βόριο (B) Σύμπλοκο Αιθανολαμίνης	2,3% (w/v)
Ειδικό βάρος	1,25 Kg/L
Χρώμα	Ανοιχτό κίτρινο

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το VIOMIX B-Zn είναι ένα υγρό εξειδικευμένο λίπασμα Οργανικού Βορίου και Χηλικού EDTA Ψευδαργύρου. Το Βόριο και ο Ψευδάργυρος είναι θρεπτικά στοιχεία αναγκαία για τον σχηματισμό των ανθέων, τη συγκράτησή τους και την ικανοποιητική γονιμοποίηση. Επιπλέον, το Βόριο είναι απαραίτητο Ιχνοστοιχείο σε ορισμένες καλλιέργειες, για την αποτροπή συνηθισμένων ανωμαλιών (κηλίδωμα στα μήλα, μαύρη καρδιά στο κουνουπίδι κ.λ.π). Η ειδική σύνθεση του προϊόντος επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία των δύο συστατικών σε υψηλές συγκεντρώσεις και σε εξαιρετικά αφομοιώσιμες μορφές για τα φυτά.

Το VIOMIX B-Zn έχει τις εξής ιδιότητες:

- Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα Ψευδαργύρου λόγω του EDTA Ψευδαργύρου και της Βοριούχου αιθανολαμίνης.
- Ασφαλές προϊόν στις συνιστώμενες δόσεις - δεν προκαλεί τοξικότητα.
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές.
- Εξαιρετικές προσκολλητικές ιδιότητες για συγκράτηση στο φύλλωμα, συγκρινόμενο με το άλας θειικού Ψευδαργύρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το VIOMIX B-Zn εφαρμόζεται τόσο μέσω της υδρολίπανσης, όσο και με διαφυλλικό τρόπο.

Γενική δοσολογία:

- 200 - 300 cc / 100 L (Διαφυλλική εφαρμογή).
- 100 - 300 cc / 1000 m² (Υδρολίπανση).

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Ελιά: 1η εφαρμογή στην έναρξη της Ανθοφορίας (στάδιο κροκιάσματος) με 200 - 300 cc /100 L νερό και επανάληψη μετά την καρπόδεση στην ίδια δοσολογία.
- Μηλοειδή: 1η εφαρμογή πριν την Ανθοφορία σε δοσολογία 200 - 300 cc /στρέμμα. Επανάληψη εφαρμογής μετά την Καρπόδεση με 150 - 200 cc / 100 L νερό.
- Πυρηνόκαρπα: Εφαρμογή μετά το στάδιο πτώσης των πετάλων με 150 - 300 cc / 100 L.
- Αμπέλι: 1η εφαρμογή στην αρχή ανάπτυξης νέων βλαστών με 200 - 300 cc / 100 L (μετά τον σχηματισμό 3-4 νέων φύλλων). 2η εφαρμογή πριν την ανθοφορία ή αμέσως μετά την καρπόδεση στην ίδια δοσολογία.
- Κηπευτικά: 100 - 300 cc / 1000 m² μέσω της υδρολίπανσης σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές (3-4), ή 100 - 200 cc / 100 L σε 3-4 εφαρμογές.
- Φυλλώδη κηπευτικά: Εφαρμογή 200 - 300 cc / 100 L στο στάδιο έναρξης σχηματισμού της κεφαλής.



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VIOMIX B-Zn συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1L, 3L