



VIOMIX CaO - MgO

Εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Ασβεστίου και Μαγνησίου, σε σύμπλοκο με Αμινοξέα.

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ασβέστιο υδατοδιαλυτό (CaO)	17% (w/v)
Μαγνήσιο υδατοδιαλυτό (MgO)	5% (w/v)
L - αμινοξέα	10% (w/v)
ρΗ	
Ειδικό βάρος	5,5
Χρώμα	1,4 Kg/L Καφέ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το VIOMIX CaO-MgO είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, για διαφυλλικές εφαρμογές, ενισχυμένης αφομοίωσης. Βασίζεται σε ένα μοναδικό σύμπλοκο Ασβεστίου, Μαγνησίου και L-αμινοξέων, συνδυασμός ο οποίος εξασφαλίζει τη μέγιστη απορρόφηση μέσω του φυλλώματος. Το Ασβέστιο, βασικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενισχύει την συνεκτικότητα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το μεταχρωματισμός και τις μετασυλλεκτικές ιδιότητες των καρπών. Μέσω των αμινοξέων, όταν το VIOMIX CaO-MgO, εφαρμοστεί στα κρίσιμα στάδια της ανθοφορίας, επάγει βιοχημικές διεργασίες, όπως είναι η συγκράτηση των ανθέων και η επιτυχής καρπόδεση. Ως αποτέλεσμα των στοχευμένων εφαρμογών VIOMIX CaO-MgO, η απόδοση και η ποιότητα των καλλιεργειών αυξάνεται δραστικά.

Το VIOMIX CaO-MgO αποτελεί:

- Προϊόν υψηλής περιεκτικότητας σε Ασβέστιο.
- Υγρό παρασκεύασμα με ευκολία ανάμειξης ακόμα και σε μικρές ποσότητες νερού.
- Απόλυτα ασφαλές στις συνιστώμενες δόσεις.
- Εύκολο στη χρήση.
- Βέλτιστη αφομοίωση Ασβεστίου - Μαγνησίου.
- Συμβατό με τα συνήθη φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το VIOMIX CaO-MgO, εφαρμόζεται με διαφυλλικό τρόπο.

Γενική δοσολογία:

- 150 - 300 cc /στρέμμα ή 2 - 3 L /1000 L ψεκαστικού διαλύματος.

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Μηλοειδή: 250 - 300 cc /100L, 5 - 7 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών μετά το στάδιο της καρπόδεσης.
- Αμπέλι: 250 - 300 cc /100L, 3 - 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών μετά το στάδιο της καρπόδεσης έως και την ωρίμανση.
- Αβοκάντο: 250 - 500 cc /100L, επαναλαμβανόμενες εφαρμογές μέχρι την ωρίμανση.
- Μπρόκολο: 250 - 300 cc /100L, 4 - 6 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών μετά τον σχηματισμό της κεφαλής.
- Λαχανάκια Βρυξελλών: 250 - 300 cc /100L, επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
- Αγγούρι, Πεπόνι, Πιπεριά και Τομάτα: 250 - 300 cc /100L, 6 - 12 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών με την έναρξη της καρποφορίας.
- Βαμβάκι: 250 - 300 cc /100L, 3 εφαρμογές. Εφαρμογές μεταξύ των σταδίων 5 - 7 φύλλα και ανθοφορία.



- Φράουλα: 250 - 300 cc /100L, αμέσως μετά την έναρξη της καρποφορίας.
- Πατάτα: 250 - 300 cc /100L, επαναλήψεις εφαρμογών, με σημείο έναρξης το σχηματισμό των πρώτων κονδύλων.
- Κερασιά, Δαμασκηλιά: 300 - 400 cc /100L, 3 - 4 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών 6 - 8 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή.
- Λάχανο, Κουνουπίδι, Μαρούλι: 250 - 300 cc /100L, 4 - 6 εφαρμογές. Έναρξη εφαρμογών αμέσως μετά τον σχηματισμό της κεφαλής.
- Καλλωπιστικά φυτά: 1 - 2 εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VIOMIX CaO-MgO μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1L, 3L, 5L