



## VIOMIX K<sub>2</sub>O

Ειδικό προϊόν θρέψης Καλίου, σε σύμπλοκο με αμινοξέα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σύμπλοκο Καλίου (K <sub>2</sub> O)	30% (w/v) - 22% (w/w)
Αμινοξέα και Ολιγοπεπτίδια	10% (w/v) - 7,5% (w/w)

pH	11
Ειδικό βάρος	1,36 Kg/L
Χρώμα	Ανοιχτό καφέ

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η εξειδικευμένη σύνθεση του VIOMIX K<sub>2</sub>O, το καθιστά μία εξαιρετικά αφομοιώσιμη και πλούσια πηγή Καλίου. Έχει σχεδιαστεί, τόσο για διαφυλλικές εφαρμογές, όσο και για εφαρμογές μέσω της υδρολίπανσης. Η μορφή συμπλόκου με αμινοξέα, χαρακτηρίζεται για τον υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας και αφομοιώσης, γεγονός το οποίο επιτρέπει το VIOMIX K<sub>2</sub>O να δρα άμεσα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Κάλιο είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για πολλές φυσιολογικές διεργασίες του φυτού, όπως η ρύθμιση του κυτταρικού ωσμωτικού δυναμικού και η ενεργοποίηση ενζύμων που εμπλέκονται στη φωτοσύνθεση, τη διαπνοή και την αναπνοή. Η επαρκής θρέψη καλίου εξασφαλίζει αντοχή σε αβιοτικές καταπονήσεις. Επιπλέον, το Κάλιο επηρεάζει τα φυσιολογικά, τα ποιοτικά και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών, γι' αυτό και είναι ευρέως γνωστό ως «θρεπτικό στοιχείο ποιότητας».

Η εφαρμογή VIOMIX K<sub>2</sub>O εξασφαλίζει:

- Προώθηση σακχάρων στα επιθυμητά σημεία έλξης.
- Αύξηση βιταμινών C, B1, καροτενίων κλπ.
- Μείωση ανεπιθύμητου οξαλικού οξέος.
- Βελτίωση αντοχής των προϊόντων κατά τη συντήρησή τους.
- Βελτίωση μεταχρωματισμού των φρούτων και των χαρακτηριστικών του καπνού.
- Ομοιομορφία και μεγαλύτερο βάρος των καρπών.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το VIOMIX K<sub>2</sub>O, εφαρμόζεται είτε μέσω της υδρολίπανσης, είτε με διαφυλλικό τρόπο, σε 'ένα μεγάλο εύρος των καλλιεργειών.

#### Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια (διαφυλλική εφαρμογή):

- Σιτηρά: 100 - 250 cc / 100 L, 4 εφαρμογές κατά τη διάρκεια επιμήκυνσης του στελέχους.
- Πατάτα: 3 - 4 εφαρμογές, με δοσολογία 200 - 300 cc / 100 L, 1 εφαρμογή στην ανάπτυξη του στελέχους, με επαναλήψεις των επόμενων εφαρμογών σε διάστημα 14 ημερών.
- Ζαχαρότευτλα: 3 - 4 εφαρμογές, με δοσολογία 250 - 300 cc / 100 L. Οι εφαρμογές γίνονται ανάμεσα στάδια 4ου φύλλου και κάλυψη του εδάφους από τα φυτά.
- Καλαμπόκι: 3 εφαρμογές, 200 - 250 cc / 100 L ψεκαστικού διαλύματος, κατά την διάρκεια της επιμήκυνσης του στελέχους.
- Κηπευτικά: 200 - 250 cc / 100 L, πολλαπλές εφαρμογές, αρχίζοντας με την αύξηση των καρπών. Επαναλήψεις ανά 14 ημέρες.
- Δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι: 2 - 3 εφαρμογές, σε δοσολογία 200 - 250 cc / 100 L. Έναρξη εφαρμογών στην ανάπτυξη των καρπών, ανά διαστήματα 15 ημερών.



### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VIOMIX K<sub>2</sub>O μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας. Συνιστάται να αναμιγνύεται καλά πριν τη προσθήκη του στο ψεκαστικό διάλυμα.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1L

**ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.** | Λιπάσματα - Γεωργικά είδη

Θέση Πηλιχό, 19300, Ασπρόπυργος | Τ.Θ. 46025, 13310, Άνω Λιόσια

info@phytothreptiki.gr | **phytothreptiki.com**