

VIOMIX SUPER

Πλήρες και ειδικό διαφυλλικό προϊόν θρέψης, υψηλής περιεκτικότητας σε Ιχνοστοιχεία χηλικής μορφής.



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άζωτο ολικό (N)	12% (w/v) - 9% (w/w)
Άζωτο Νιτρικό (NO ₃)	5,1% (w/v) - 3,8% (w/w)
Άζωτο Ουρικό (NH ₂)	6,9% (w/v) - 5,2% (w/w)
Κάλιο (K ₂ O) 100% υδατοδιαλυτό	8% (w/v) - 6% (w/w)
Μαγνήσιο (MgO)	3% (w/v) - 2,22% (w/w)
Χαλκός (Cu) EDTA	0,3% (w/v) - 0,25% (w/w)
Σίδηρος (Fe) EDTA	2,5% (w/v) - 1,8% (w/w)
Μαγγάνιο (Mn) EDTA	1% (w/v) - 0,75% (w/w)
Βόριο (B)	0,3% (w/v) - 2,25% (w/w)
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA	2% (w/v) - 1,5% (w/w)
Θείο (S)	1,5% (w/v) - 1,1% (w/w)
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,0013% (w/v) - 0,001% (w/w)
Αμινοξέα, Εκχύλισμα φυκών και ζύμης	6% (w/v) - 4,44% (w/w)

ρΗ	5,5
Ειδικό βάρος	1,33 Kg/L
Χρώμα	Καφέ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το VIOMIX SUPER είναι ένα πλήρες διαφυλλικό προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, πλούσιο σε Άζωτο, Κάλιο, Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία υψηλής αφομοιωσιμότητας. Αποτελεί ένα δυναμικό προϊόν αντιμετώπισης συνδυασμένων τροφοπενιών, καθώς η αναλογία των συστατικών του, το καθιστά απαραίτητο συμπλήρωμα θρέψης των καλλιεργειών, ενισχύοντας σημαντικά την ανάπτυξη και την καρποφορία τους. Η ειδική μέθοδος παραγωγής του, μορφής GEL, εξασφαλίζει την ταυτόχρονη και σταθεροποιημένη παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων Μάκρο και Μικροθρεπτικών συστατικών. Τα Ιχνοστοιχεία βρίσκονται σε προστατευμένη μορφή και απελευθερώνονται μόνο μετά την είσοδό τους στα επιδερμικά κύτταρα των φύλλων.

Επιπλέον, το VIOMIX SUPER περιέχει ρυθμιστικά συστατικά, τα οποία εξασφαλίζουν το ιδανικό pH, για την εφαρμογή του ψεκαστικού διαλύματος.

Η εφαρμογή του VIOMIX SUPER, εξασφαλίζει:

- Υψηλή και ισορροπημένη συγκέντρωση Μακροθρεπτικών και Μικροθρεπτικών συστατικών, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.
- Άριστη αφομοίωση θρεπτικών συστατικών.
- Ρύθμιση pH (ρυθμιστικό διάλυμα) του ψεκαστικού διαλύματος.
- Εξαιρετική προσκολλητικότητα και κάλυψη του φυλλώματος.
- Υψηλής μορφής χηλικοποίηση, η οποία μειώνει τη σκληρότητα του νερού στο ψεκαστικό διάλυμα.
- Ασφαλές προϊόν για όλες τις καλλιέργειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το VIOMIX SUPER εφαρμόζεται με διαφυλλικό τρόπο.

Γενική δοσολογία:

- 150 - 250 cc / 100 L (Διαφυλλική εφαρμογή)

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα): 150 – 300 cc / 100 L, 1η εφαρμογή στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων πραγματικών φύλλων και με επαναλήψεις ανά 10 – 15 ημέρες.
- Νεαρά φυτά σε γλάστρες: 100 – 150 cc / 100 L, στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων πραγματικών φύλλων.
- Ανεπτυγμένα φυτά σε γλάστρες: 250 – 300 cc / 100 L, με επαναλήψεις ανά 10 – 15 ημέρες.
- Φυτώδια δένδρων: 100 – 250 cc / 100 L, στο στάδιο εμφάνισης των πρώτων πραγματικών φύλλων, με επαναλήψεις ανά 10 – 15 ημέρες.
- Καρπούζι, Πεπόνι: 250 – 300 cc / 100 L, στο στάδιο της μεταφύτευσης, με επαναλήψεις ανά 15 ημέρες.
- Μπανάνα: 250 – 300 cc / 100 L, 5 – 6 εφαρμογές.
- Φασόλι – Μπιζέλι: 250 – 300 cc / 100 L, 4 εφαρμογές: 1. Πριν την ανθοφορία, 2. Ανθοφορία, 3. Ανθοφορία, 4. 15 ημέρες μετά το στάδιο της ανθοφορίας.
- Σταυρανθή (Μπρόκολο – Λάχανο): 150 – 250 cc / 100 L, 4 εφαρμογές με την 1η στο στάδιο της μεταφύτευσης. Επαναλήψεις ανά 15 ημέρες μέχρι και την 4η εφαρμογή.
- Καρότο: 150 – 250 cc / 100 L, 6 εφαρμογές ανά 15 ημέρες.
- Σιτηρά: 150 – 250 cc / 100 L, συνδυαστικά με τους ψεκασμούς φυτοπροστασίας.
- Εσπεριδοειδή: 500 cc / 100 L, 6 εφαρμογές: 1. Χειμώνας, 2. Πριν την εμφάνιση των ανθέων, 3. Μετά την πτώση των πετάλων. 4η έως και 6η εφαρμογή: Εφαρμογές ανά 15 ημέρες.
- Βαμβάκι: 250 – 300 cc / 100 L, 5 εφαρμογές σε συνδυασμό με τους ψεκασμούς φυτοπροστασίας.
- Καλαμπόκι: 250 – 300 cc / 100 L, 4 εφαρμογές: 1η εφαρμογή στο στάδιο ύψους των φυτών στα 15 – 25 cm, 2η – 4η εφαρμογή σε διαστήματα ανά 15 ημέρες.
- Μάνγκο: 500 cc / 100 L, 3 εφαρμογές, 1η στο στάδιο πριν την ανθοφορία, 2η και 3η εφαρμογή σε διαστήματα μίας εβδομάδας μετά την ανθοφορία.
- Ζαχαροκάλαμα: 800 cc / 100 L, 1 – 2 εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 25 – 35 cm.
- Παπάγια: 500 cc / 100 L, τουλάχιστον μία φορά το μήνα όταν η καλλιέργεια είναι 4 μηνών.
- Ανανάς: 400 – 500 cc / 100 L, 5 εφαρμογές: 1η λίγο πριν την ανθοφορία, 2η – 5η εφαρμογή μετά την ανθοφορία σε διαστήματα 20 ημερών.
- Σόγια: 250 – 300 cc / 100 L, 3 εφαρμογές, 1η εφαρμογή μετά την πρώτη ανθοφορία και μετά επαναλήψεις μέχρι και 3η ανά 15 ημέρες.
- Φράουλα: 150 – 250 cc / 100 L, 1η εφαρμογή μετά την μεταφύτευση και στη συνέχεια επαναλήψεις ανά 15 ημέρες.
- Τσάι: 300 – 400 cc / 100 L, 6 εφαρμογές, 1η εφαρμογή όταν σχηματίζοντα τα μπουμπούκια των φύλλων, 2η έως και 6η εφαρμογή ανά διαστήματα 3 εβδομάδων.
- Καπνός: 250 – 300 cc / 100 L, 1η εφαρμογή στο στάδιο των 4 – 5 φύλλων, στη συνέχεια εφαρμογές ανά διαστήματα 3 εβδομάδων.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το VIOMIX SUPER συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1L, 3L