



Crop-Set

Εξειδικευμένο σκεύασμα, εξασφάλισης ορμονικής ισορροπίας σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο

Μη ζωντανό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30-05-2018

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Περιέχει μέσα ζύμωσης του **βακτηρίου Lactobacillus acidophilus*** και **εκχύλισμα Yucca**.

** Δεν περιέχει ζωντανά βακτήρια*

Θείο (S) ολικό	2% (w/w)
Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός	1,6% (w/w)
Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός	0,8% (w/w)
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό	3,2% (w/w)
pH	3,5
Ειδικό βάρος	1,13 g /cm ³

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για **εξασφάλιση ορμονικής ισορροπίας** σε κάθε καλλιεργητικό στάδιο.

Το **Crop-Set**, είναι ένα καινοτόμο σκεύασμα, με ενσωματωμένη τεχνολογία ζύμωσης και υψηλής ποιότητας θρεπτικά συστατικά. Ο σχεδιασμός του **Crop-Set**, έχει βασιστεί σε μακροχρόνια έρευνα, εξειδικευμένη στη δράση εκχυλισμάτων ζύμης. Βασίζεται σε τεχνολογία Alltech και όταν εφαρμοστεί σε διάφορα καλλιεργητικά στάδια, εξισορροπεί ορμονικά το φυτό ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Βελτιώνει τόσο τα χαρακτηριστικά απόδοσης, όσο και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού.

Το **Crop-Set** εφαρμόζεται **διαφυλλικά**, εξασφαλίζοντας:

- Ορμονική ισορροπία στις καλλιέργειες.
- Αυξημένη μεταβολική και φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών.
- Θρεπτικά συστατικά για ενίσχυση των μεταβολικών διεργασιών των φυτών.
- Μείωση αβιοτικού stress.
- Περιορισμό ποσοστού απόκλισης της απόδοσης (Yield gap).
- Βελτίωση ποιότητας των καρπών και μετασυλλεκτικής τους διάρκειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμόζεται διαφυλλικά, σε όλες τις καλλιέργειες.

Γενική δοσολογία εφαρμογής: 60 cc /στρέμμα

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

1. Πυρηνόκαρπα – Μηλοειδή: 60 cc /στρέμμα, μετά την πτώση των πετάλων και στο στάδιο διαμέτρου του καρπού 1 cm. Επανάληψη εφαρμογής στο στάδιο διαμέτρου του καρπού 4-5 cm.
2. Βολβοί: 60 cc /στρέμμα, στο στάδιο 5 – 6 φύλλων.
3. Μπιζέλια – Φασόλια: 60 cc /στρέμμα, στο στάδιο 5-6 φύλλων.
4. Εσπεριδοειδή: 60 cc /στρέμμα, στην ανθοφορία, στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του καρπού, 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή.
5. Καρότο: 60 cc /στρέμμα, στο στάδιο 5-6 φύλλων. Επανάληψη μετά από 1 μήνα.
6. Κηπευτικές καλλιέργειες: 60 cc /στρέμμα, στην αρχή της ανθοφορίας, επαναλήψεις ανά 15 ημέρες.
7. Πατάτα (εμπορική κατανάλωση): 60 cc /στρέμμα κατά την πρώιμη διόγκωση των κονδύλων (2-4 cm) και επανάληψη μετά από 2 εβδομάδες.
8. Πατάτα (σπόροι πατάτας): 60 cc /στρέμμα, κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων (αγκίστρωση). Επανάληψη μετά από 10 ημέρες.
9. Πατάτα (βιομηχανία): 60 cc /στρέμμα σε μεταγενέστερη διόγκωση των κονδύλων (>2-4 cm). Επανάληψη μετά από 15 ημέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Crop-Set συνδυάζεται αποτελεσματικά με τα περισσότερα αγροχημικά σκευάσματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

240 cc, 480 cc, 960 cc