

STIM MAX

Υγρό Διαφυλλικό Λίπασμα Αζώτου (N)



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αζώτο (N) Ολικό 100% υδατοδιαλυτό	4% (w/w)
Ουρικό (NH ₂)	4% (w/w)
Kinetin	0,02% (w/w)
Kelp Extract	5% (w/w)
Indole-3-butyric acid (IBA)	0,02% (w/w)
Gibberellic Acid (GA3)	0,016% (w/w)
Salicylic Acid	0,02% (w/w)
Vitamin C	0,02% (w/w)
pH (1:10)	8 - 10
Ειδικό βάρος	0,974 - 1,190 g/cm ³

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα αζώτου 4-0-0 + 5% kelp. Το stim max περιέχει τρεις ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών μαζί με βιοδιεγέρτες οι οποίοι ενισχύουν την ανάπτυξη και βοηθούν στη μείωση του περιβαλλοντικού stress.] Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ειδικού προϊόντος θρέψης, είναι η υψηλή συγκέντρωση των τριών ορμονών ανάπτυξης που περιέχονται σε αυτό, Αυξινών (IAA), Κυτοκινινών (CKs) και Γιββερελλινών (GAs) (400 ppm), γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματικό στην υποβοήθηση των καλλιεργειών, σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια, όπως η ανθοφορία, η μείωση της ανθόρροιας, το φύτρωμα κ.α και στο περιορισμό του αβιοτικού stress.

Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα του στις 3 βασικές φυτικές ορμόνες ανάπτυξης, αποτελεί και πηγή Σαλικυλικού οξέος (SA).

Η εφαρμογή του Stim max εξασφαλίζει:

- Ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε καταστάσεις αβιοτικού stress.
- Περιορισμένη ανθόρροια.
- Ποιότητα ανθοφορίας.
- Επιτυχή επικονίαση και γονιμοποίηση.
- Ενισχυμένη απόδοση και ποιότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το Stim max εφαρμόζεται διαφυλλικά.

Γενική δοσολογία:

- Μέσω διαφυλλικής εφαρμογής: 100 cc/ στρέμμα.

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, φράουλα, : 100 cc /100 L από το στάδιο της άνθησης μέχρι την ωρίμανση/συγκομιδή.
- Καρπούζι, πεπόνι: 100 cc /100 L από το στάδιο της άνθησης μέχρι την καρπόδεση.
- Ελιά: 50-100 cc /100 L από την άνθηση μέχρι την καρπόδεση.
- Πυρηνόκαρπα, μηλοειδή: 50-100 cc /100 L από την λευκή κορυφή-άνθηση μέχρι την πτώση των πετάλων.
- Αμπέλι οиноποιήσιμο, αμπέλι επιτραπέζιο: 100 cc /100 L κατά το στάδιο στο οποίο η ταξιανθία έχει μέγεθος 10-15 εκ. 1 εφαρμογή.
- Ροδιά: 100 cc /100 L κατά την ανάπτυξη των καρπών. 1 εφαρμογή.
- Εσπεριδοειδή: 100 cc /100 L κατά την προ-άνθηση μέχρι την άνθηση.
- Αβοκάντο: 100 cc /100 L κατά την προ-άνθηση μέχρι τα μέσα της άνθησης. 1 εφαρμογή.
- Μπανανιά: 100 cc /100 L 5-6 εβδομάδες μετά μέχρι την άνθηση. 1 εφαρμογή.



- Ακτινίδιο: 100 cc /100 L κατά την έναρξη της βλάστησης. 1 εφαρμογή.
- Αγκινάρα: 100 cc /100 L κατά τον σχηματισμό των 5-6 πρώτων φύλλων μέχρι την έναρξη σχηματισμού του άνθους.
- Φασολιά: 100 cc /100 L κατά την προ-άνθηση μέχρι την καρπόδεση.
- Βαμβάκι: 50-100 cc /100 L κατά το στάδιο της έκπτυξης 3-4 φύλλων. 1 εφαρμογή. 50-100 cc/100 L κατά την ανθοφορία. 1 εφαρμογή.
- Σιτάρι: 50-100 cc /100 L κατά το αδελφωμα μέχρι το καλάμωμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα τα οποία περιέχουν φυτορυθμιστικές ουσίες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

500cc