



## Agro-mos

Ειδικό σκεύασμα, ενίσχυσης αντοχής των φυτών σε συνθήκες stress

Μη ζωντανό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30-05-2018

### **ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Περιέχει μέσα ζύμωσης του **βακτηρίου Lactobacillus acidophilus\*** και **εκχύλισμα μαγιάς του Saccharomyces Cerevisiae.**

*\* Δεν περιέχει ζωντανά βακτήρια*

Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός	4% (w/w)
pH	3,1
Ειδικό βάρος	1,18 g /cm <sup>3</sup>

### **ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για **ενίσχυση αντοχής των καλλιεργειών σε συνθήκες stress.**

Το **Agro-Mos**, είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν πειραματισμού Ομικών Θρέψης (Nutrigenomics), στον *Saccharomyces cerevisiae* SP.1026. Έχει σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύει την αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες stress.

Εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης ή διαφυλλικά, εξασφαλίζοντας:

- Ενίσχυση αντοχής των καλλιεργειών σε συνθήκες stress.
- Συμπλήρωση προγραμμάτων εφαρμογών και διαχείρισης stress.
- Ενεργοποίηση μοριακών μονοπατιών σηματοδότησης φυτικών ορμονών JA & SA.

## **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης ή δια ψεκασμού του εδάφους.

**Γενική** δοσολογία εφαρμογής: 100 cc /στρέμμα

**Ειδική** δοσολογία ανά καλλιέργεια:

1. Τομάτα, Καρπούζι, Αγγούρι, Πεπόνι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα: 100 cc /στρέμμα, αρχίζοντας 1 εβδομάδα μετά την μεταφύτευση. Επαναλήψεις ανά 15 ημέρες, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας.
2. Πατάτα: 100 cc /στρέμμα, κατά την φύτευση. Επαναλήψεις ανά 15 ημέρες, με τουλάχιστον 5 εφαρμογές. Οι εφαρμογές βρίσκονται σε εναλλαγή με το συμβατικό πρόγραμμα και με το PRO CROP SHIELD.
3. Πυρηνόκαρπα & Μηλοειδή: 100 cc /στρέμμα ανά 15 ημέρες. Οι εφαρμογές βρίσκονται σε εναλλαγή με το συμβατικό πρόγραμμα.
4. Εσπεριδοειδή: 100 cc /στρέμμα, κάθε 2-3 εβδομάδες από την έκπτυξη των οφθαλμών.
5. κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής & 200 cc /στρέμμα μετασυλλεκτικά.
6. Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο): 100 cc /στρέμμα στα 3-4 φύλλα. Επαναλήψεις ανά 2 εβδομάδες για 6-8 εφαρμογές.
7. Ακτινίδιο: 100 cc /στρέμμα, στην έκπτυξη οφθαλμών. Επαναλήψεις ανά 2-3 εβδομάδες, σε εναλλαγή με το συμβατικό πρόγραμμα.
8. Φυλλώδη λαχανικά: 200 cc /στρέμμα, κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας
9. Κρεμμύδι: 100 cc /στρέμμα αρχίζοντας 1 εβδομάδα μετά την μεταφύτευση. Επαναλήψεις ανά 2 εβδομάδες, εναλλακτικά με το συμβατικό πρόγραμμα.
10. Φυλλώδη λαχανικά: 150 cc /στρέμμα, 1 εβδομάδα μετά την μεταφύτευση. Επαναλήψεις ανά 1 – 2 εβδομάδες.
11. Φράουλα: 100 cc /στρέμμα, αρχίζοντας 1 εβδομάδα μετά την μεταφύτευση. Επαναλήψεις ανά 15 ημέρες, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας.

## **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το **Agro-Mos** συνδυάζεται αποτελεσματικά με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα.

## **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

500 cc, 1 L