

stim max

Εξειδικευμένο σκεύασμα, υψηλής συγκέντρωσης φυτικών ορμονών ανάπτυξης

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αζωτο (N) Ολικό, 100% υδατοδιαλυτό	4% (w/w)
Ουρικό Αζωτο (NH ₂)	4% (w/w)
Κινετίνη	0,02% (w/w)
Ινδολ-3-βουτικό οξύ (IBA)	0,02% (w/w)
Γιββερελλικό οξύ (GA3)	0,016% (w/w)
Σαλικυλικό οξύ (SA).	0,02% (w/w)
Βιταμίνη C	0,02% (w/w)
Εκχύλισμα φυκών	5% (w/w)
pH	8-10
Αλατότητα	0,97 ο/οο
Ειδικό βάρος	0,974-1.190 g /cm ³

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για **ενίσχυση ανθοφορίας-καρπόδεσης και μείωσης φυτοτοξικότητας** των καλλιεργειών.

Stim max, ένα ειδικό προϊόν υψηλής συγκέντρωσης των τριών ορμονών ανάπτυξης, Αυξινών (IAA), Κυτοκινινών (CKs) και Γιββερελλινών (GAs). Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην υποβοήθηση των καλλιεργειών, σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια, όπως η ανθοφορία, η μείωση της ανθόρροιας, το φύτρωμα κ.α και ο περιορισμός του αβιοτικού stress.

Εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα του στις 3 βασικές φυτικές ορμόνες ανάπτυξης, αποτελεί και πλούσια πηγή Σαλικυλικού οξέος (SA).

Η εφαρμογή του **stim max** εξασφαλίζει:

- Ενίσχυση της αντοχής των φυτών σε καταστάσεις αβιοτικού stress.
- Περιορισμένη ανθόρροια.
- Ποιότητα ανθοφορίας.
- Επιτυχή επικονίαση και γονιμοποίηση.
- Μείωση φυτοτοξικότητας-αβιοτικού stress, σε περίπτωση συνδυασμού με ζιζανιοκτόνο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Γενικές δοσολογίες ανά κατηγορία καλλιεργειών:

Εκτατικές καλλιέργειες: 25 – 50 cc /στρέμμα

Κηπευτικές καλλιέργειες: 50 – 100 cc /στρέμμα

Δενδρώδεις καλλιέργειες: 50 – 100 cc /στρέμμα

Ειδικές δοσολογίες ανά καλλιέργεια:

Εκτατικές καλλιέργειες:

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δοσολογία
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε, Ρύζι, Σόγια, Σόργο	1 εφαρμογή, μετά το αδελφωμα έως πριν την καρπόδεση	12,5 – 15 cc /στρέμμα
Καλαμπόκι	1 εφαρμογή, αμέσως μετά το αδελφωμα	25 cc /στρέμμα
Μηδική	1 εφαρμογή, μετά από κάθε κοπή ή έντονη βόσκηση	25 cc /στρέμμα
Βαμβάκι	1- 2 εφαρμογές, από τα πρώτα χτένια – αρχή της ανθοφορίας	50 – 60 cc /στρέμμα
Βιομηχανική τομάτα	1-3 εφαρμογές, ανθοφορία - καρπόδεση	50 – 100 cc /στρέμμα
Καπνός	1 εφαρμογή, βλαστική ανάπτυξη	50 – 100 cc /στρέμμα
Φασόλι	1 εφαρμογή, ανθοφορία	25 cc /στρέμμα
Ελαιοκράμβη	1 εφαρμογή, πριν την ανθοφορία	12,5 – 15 cc /στρέμμα
Ηλίανθος	1 εφαρμογή, πριν την ανθοφορία	12,5 – 15 cc /στρέμμα
Πατάτα, Γλυκοπατάτα	1 – 2 εφαρμογές, από την ωρίμανση έως πριν την ωρίμανση του κονδύλου	50 cc /στρέμμα

Κηπευτικές καλλιέργειες:

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δοσολογία
Τομάτα	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Αγγούρι	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Μελιτζάνα	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Πιπεριά	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Καρπούζι, Πεπόνι	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Κολοκύθι, Γλυκοκολοκύθι	1-4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Λαχανάκι Βρυξελλών	1-2 εφαρμογές, κατά την εμφάνιση της ταξιανθίας	50 cc /στρέμμα
Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ραπανάκι, Μανιτάρι	1 – 3 εφαρμογές, από τη βλαστική ανάπτυξη έως την ωρίμανση	50 cc /στρέμμα
Σελινόριζα, Σέλερι	1 – 2 εφαρμογές, από το στάδιο των 3-4 φύλλων	50 cc /στρέμμα
Γλυκό καλαμπόκι, Popcorn	1 εφαρμογή, στην εμφάνιση του σπάδικα	25 cc /στρέμμα
Μαρούλι, Σπανάκι	1 – 3 εφαρμογές, από την εμφάνιση των 3 φύλλων έως το 50% σχηματισμό της κεφαλής	50 – 100 cc /στρέμμα
Σπαράγγι	Για νέες φυτεύσεις: 1 εφαρμογή στην βλαστική ανάπτυξη	50 – 100 cc /στρέμμα
Φράουλα - Berries	1 – 4 εφαρμογές, από την πρώτη ανθοφορία	50 – 100 cc /στρέμμα

Αρωματικά φυτά:

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δοσολογία
Ρίγανη, Δενδρολίβανο, Λεβάντα, Βασιλικός, Σχοινόπρασο, Κόλιαντρο, νηθος, Μάραθος, Μαντζουράνα, Μοσχοκάρυδο, Σαφράν, Φασκόμηλο, Ρόσμαρι, Εστραγκόν	1 – 3 εφαρμογές, από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων	40 – 50 cc /στρέμμα

Δενδρώδεις καλλιέργειες:

Καλλιέργεια	Στάδιο εφαρμογής	Δοσολογία
Ελιά	1 εφαρμογή, στο 80% της ανθοφορίας (ελαιοποιήσιμη, καλαμών, Χαλκιδικής)	50 - 100 cc /στρέμμα
Πυρηνόκαρπα – Μηλοειδή – Ροδιά – Ακρόδρυα – Συκιά	1 – 2 εφαρμογές, στο 10% της ανθοφορίας & στο 80% της ανθοφορίας	50 - 100 cc /στρέμμα
Εσπεριδοειδή	1 – 2 εφαρμογές, στο 10% της ανθοφορίας & στο 80% της ανθοφορίας	50 - 100 cc /στρέμμα
Αμπέλι	1-3 εφαρμογές, κατά την ανθοφορία και καρπόδεση	50-100 cc /στρέμμα
Ακτινίδιο	1 – 2 εφαρμογές, κατά την ανθοφορία	50-100 cc /στρέμμα