



Πρόγραμμα θρέψης | Μπανανιά

Υδρολίπανση



	Παραφυάδες 5 – 6 φύλλων	5 – 6 εβδομάδες μετά	Άνθηση	Αύξηση καρπού	Ωρίμανση - Συγκομιδή
Βασική – Επιφανειακή λίπανση και Υδρολίπανση - εφοδιασμός με NPK + CaO	SLOWTEC 12-6-18+4+TE, 100 kg/στρέμμα				
	NEON 40-0-0 ή PHYTO CAL ή SLOWTEC 21-0-0+B, 40 - 60 kg /στρέμμα				
	POLY PLANT 30-10-10 4-5 kg /στρέμμα /εβδομάδα			POLY PLANT 14-6-28+5 4-5 kg/ εβδομάδα	
Διόρθωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδάφους	K – HUMATE 26 1 L /στρέμμα, 2 – 3 εφαρμογές συνολικά				
Εφοδιασμός με Ιχνοστοιχεία	PHYTOPLEX SP 1 kg /στρέμμα όποτε απαιτείται				
		Zn ELEMENTS 1 kg /στρέμμα και SOLUBOR DF 1 kg /στρέμμα			
	FERRI GREEN 1 kg /στρέμμα, όποτε απαιτείται				
Διόρθωση αλατότητας εδάφους	SALT MOVER 2-3 L /στρέμμα, 2– 3 επαναλήψεις				
Εφοδιασμός με Κάλιο, Μαγνήσιο Ωρίμανση – βελτίωση ποιότητας καρπών					SOL PRO K 3 - 4 L /στρέμμα
				SOL PRO CaO 3-5 L /στρέμμα + NITRO Mag 3-5 L /στρέμμα, 2-3 εφαρμογές	

*Οι προτεινόμενες εφαρμογές και δοσολογίες των προϊόντων χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια πρόταση και είναι ενδεικτικές.



Πρόγραμμα θρέψης | Μπανανιά

Διαφυλλικά



	Παραφυάδες 5 – 6 φύλλων	5 – 6 εβδομάδες μετά	Άνθηση	Αύξηση καρπού (μέγεθος ράγας 30 – 40 mm)	Ωρίμανση - Συγκομιδή
Ενίσχυση της βλάστησης				STIM 82 MGX 100 gr/ 100L, ALGA CREAM 250 cc /100L	
Εφοδιασμός με NPK				BEST 28-20-10 500-600 gr /100L	
Ενίσχυση της Ανθοφορίας και της Καρπόδεσης				STIM CYTOKELP 50 cc/100L ή NITROZYME 100 cc/ 100L, 2 εφαρμογές	
Εφοδιασμός με Ιχνοστοιχεία					
Εφοδιασμός με Ασβέστιο και Μαγνήσιο				CALCIFOL 200 gr /100L, εναλλακτικά με VIOMIX CaO-MgO, 2-3 εφαρμογές	
		STIM MAX 100 cc /100 L ή MEGAKELP 250 cc /100L, 1 εφαρμογή			
		VIOMIX Zn 250 cc /100L, 1 εφαρμογή VIOMIX ACTIVE 300 cc /100L, 1 εφαρμογή			