







Πρόγραμμα θρέψης | Βαμβάκι



	Σπορά - Φύτρωση	3 – 4 φύλλα Βλαστική ανάπτυξη	Πρώτα χτένια	Ανθοφορία	Καρπόδεση	Γέμισμα καρυδιού	Ωρίμανση	Συγκομιδή
Βασική λίπανση	STAMPA 20 – 20 – 0 ή SLOWTEC 14 – 14 – 14 + 2MgO							
Επιφανειακή λίπανση			NEON 40 – 0 – 0 + 0,2 B + 0,1 Zn ή STAMPA 40 – 0 – 0 + 7 CaO.					
Μείωση αβιοτικού stress		STIM MAX 50 – 100 cc /100L, 1 εφαρμογή 						
Εφοδιασμός με Ιχνοστοιχεία			VIOMIX ACTIVE 150 - 300 cc /100L, 1 - 2 εφαρμογές 					
Ορμονική Ισορροπία				STIM MAX 50 – 100 cc /100L, 1 εφαρμογή 		STIM CYTOKELP 50 cc /100L 		
Χρήση τεχνολογίας PGH				BEST 10-50-10 σε εναλλακτικά με BEST 20 – 20 – 20, 250 – 300 gr /100L 		BEST 9-15-27, 250 – 300 gr /100L 		

*Οι προτεινόμενες εφαρμογές και δοσολογίες των προϊόντων χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια πρόταση και είναι ενδεικτικές.