



active power

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα Βορίου (B), Ψευδαργύρου (Zn) και Μολυβδαινίου (Mo)

ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βόριο (B) ως σύμπλοκο με Μονοοιθανολαμίνη, 100% υδατοδιαλυτό	5% (w/w)
Ψευδάργυρος (Zn), 100% υδατοδιαλυτός	5% (w/w)
Μολυβδαίνιο (Mo), 100% υδατοδιαλυτό	0,1% (w/w)
pH	9
Ειδικό βάρος	1,32 kg /L

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για **ποιότητα ανθοφορίας** των καλλιεργειών.

active power, ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης Βορίου (B), Ψευδαργύρου (Zn) και Μολυβδαινίου (Mo).

Το **active power** είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα συνδυασμού μικροθρεπτικών συστατικών **Βορίου (B), Ψευδαργύρου (Zn)** και **Μολυβδαινίου (Mo)**, σε υγρή μορφή και σταθεροποιημένου pH. Το Βόριο (B), συμμετέχει στην κυτταρική επιμήκυνση, σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων, σε ορμονικές αλληλεπιδράσεις, στην μετακίνηση σακχάρων και αφομοίωση του Καλίου (K) και του Φωσφόρου (P). Ο Ψευδάργυρος (Zn), αποτελεί πρόδρομη ένωση των Αυξινών, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην κυτταρική διαίρεση και ανάπτυξη των ιστών, ενώ το Μολυβδαίνιο (Mo), συμμετέχει στον μεταβολισμό του Αζώτου (N). Τα μικροθρεπτικά συστατικά βρίσκονται σε εξαιρετικά αφομοιώσιμη μορφή και συνεισφέρουν ταυτόχρονα στο φυτό, παρέχοντας τις σωστές αναλογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξή του, στα κρίσιμα φαινολογικά στάδια.

Η εφαρμογή του active power εξασφαλίζει:

1. Ποιότητα **ανθοφορίας**
2. Ομοιόμορφη και ενισχυμένη **καρπώδεση**
3. Επαγωγή **αποθησαύρισης σακχάρων** στο ριζικό σύστημα (στην περίπτωση των μετασυλλεκτικών εφαρμογών)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **active power** εφαρμόζεται διαφυλλικά και μέσω της υδρολίπανσης.

Γενική δοσολογία:

1. Μέσω διαφυλλικής εφαρμογής: 100 - 300 ml /100L
2. Μέσω υδρολίπανσης: 250 ml /στρέμμα

Ειδική δοσολογία:

1. Πυρηνόκαρπα: Εφαρμογή μετά την πτώση των πετάλων και μετασυλλεκτικά - 300 ml /100 L
2. Μηλοειδή: Εφαρμογή μετά την πτώση των πετάλων και μετασυλλεκτικά - 300 ml /100 L
3. Αμπέλι: 1^η εφαρμογή προ-ανθικά και 2^η εφαρμογή μετά την καρπόδεση, 300 ml /100L
4. Ελιά: 1^η εφαρμογή κατά την έναρξη της ανθοφορίας (στάδιο «κροκιάσματος») - 200 ml /100L & 2^η εφαρμογή μετά την καρπόδεση 200 ml /100L
5. Κηπευτικές καλλιέργειες: 1^η εφαρμογή πριν το δέσιμο του πρώτου σταυρού - 200 – 300 ml /100L
6. Φυλλώδη λαχανικά: 1^η εφαρμογή μόλις τα φυτά αποκτήσουν επαρκές φύλλωμα για την αφομοίωση του προϊόντος – 200 ml /100L.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αγροχημικά σκευάσματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται πιλοτική δοκιμή, μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1 L, 3L, 5L